

Utipro®

plus

Ενδειγμένη χρήση

Το Utipro plus ενδείκνυται για τον έλεγχο και την πρόληψη των λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος, που προκαλούνται από παθογόνα όπως το *E. coli* και άλλα Gram(-) βακτηρίδια, που συνήθως εμπλέκονται στην αιτιοπαθολογία ουρολοιμώξεων.

Το Utipro plus, χάρη στο σύμπλοκο από Gelatin και Xyloglucan (Hemicellulose), δρα μηχανικά στον εντερικό αυλό κι εμποδίζει την επαφή των παθογόνων με τον εντερικό βλεννογόνο, η οποία αποτελεί το πρώτο βήμα για τον πολλαπλασιασμό τους και την επακόλουθη μετάβασή τους στο ουροποιητικό σύστημα.

Το Utipro plus λαμβάνεται από του στόματος, με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των διαταραχών του ουροποιητικού συστήματος, με στόχο τη μείωση του πολλαπλασιασμού των παθογόνων, που μπορεί να μεταπέσουν σε λοιμώξεις.

Σε περίπτωση υποτροπών της λοίμωξης, το Utipro plus ενδείκνυται επίσης για την πρόληψη νέων επεισοδίων, κατά τα οποία ο πολλαπλασιασμός των παθογόνων προκαλεί επαναλαμβανόμενες ουρολοιμώξεις.

Συσκευασία

Η συσκευασία περιλαμβάνει blister με 15 κάψουλες.

Σύνθεση

Σύμπλοκο από Gelatin και Xyloglucan (Hemicellulose), Propolis, Hibiscus sabdariffa, Silicon dioxide, Magnesium Stearate, Corn starch.

Δοσολογία

Το Utipro plus πρέπει να λαμβάνεται από του στόματος ως εξής: 2 κάψουλες την ημέρα για 5 ημέρες, σε περίπτωση ασθενών, που αναπτύσσουν τα πρώτα ενδοχλητικά συμπτώματα λοίμωξης του ουροποιητικού και 1 κάψουλα την ημέρα, για τουλάχιστον 15 διαδοχικές ημέρες το μήνα, για την πρόληψη υποτροπής (αν κριθεί απαραίτητο, το Utipro Plus μπορεί να ληφθεί για επαναλαμβανόμενους κύκλους).

Οδηγίες χρήσης

Καταπιείτε την κάψουλα με νερό.

Προειδοποιήσεις

- Η διάγνωση μιας ουρολοιμώξης θα πρέπει να γίνει από έναν Επαγγελματία Υγείας. Συνιστούμε ως εκ τούτου, να συμβουλευτείτε Επαγγελματία Υγείας σε περίπτωση αμφιβολιών για τη διάγνωση, σε περίπτωση εμφάνισης σοβαρών συμπτωμάτων, όπως υψηλός πυρετός, εάν είστε κάτω των 14 ετών ή εάν πάσχετε κι από άλλες ασθένειες ή έχετε άλλους παράγοντες κινδύνου.
- Μια οξεία λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος μπορεί να απαιτεί φαρμακευτική αντιμετώπιση με αντιβιοτικό.
- Το Utipro plus δεν είναι αντιβιοτικό και δε διαθέτει ούτε βακτηριδιοκτόνες ούτε βακτηριδιοστατικές ιδιότητες κατά των παθογόνων και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υποκαταστήσει τέτοια θεραπεία, όταν συστηθεί από τον Επαγγελματία Υγείας. Εφόσον απαιτείται φαρμακευτική αγωγή, το Utipro plus μπορεί να συγχρηρηγηθεί με αυτή.
- Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες ενέργειες, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το σκεύασμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή κατά τους πρώτους μήνες της γαλουχίας.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, συμβουλευτείτε πρώτα τον ιατρό σας.
- Μην χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μετά την ημερομηνία λήξεως, που αναγράφεται στη συσκευασία.
- Μην πάρετε τις κάψουλες, εάν το blister είναι ανοιγμένο ή κατεστραμμένο.
- Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου σε ξηρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας.
Μην το ψύχετε.
- Φυλάξτε το σκεύασμα μακριά από τα παιδιά.

Αντενδείξεις και ανεπιθύμητες ενέργειες

Το Utipro plus δεν πρέπει να λαμβάνεται από ασθενείς με διαγνωσμένη υπερευαισθησία στη ζελατίνη ή σε κάποιο άλλο από τα συστατικά του.

PC GR 250005