

Tasectan®

Προτεινόμενη χρήση

Το Tasectan είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν, που χροσιμοποιείται για την αποκατάσταση της φυσιολογικής πειτουργίας των τοιχωμάτων του εντέρου. Πιο ειδικά, έχει δημιουργηθεί για τον έλιγχο και την μείωση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με την διάρροια, που οφείλεται σε διάφορες αιτίες, όπως κοιλιακή διάταση και συχνές κενώσεις. Η αποτελεσματικότητά του εκδηλώνεται εντός 12 ωρών.

Το TASECTAN αποτελείται από ένα σύμπλοκο ζελατίνης με ταννικό οξύ που δρα μηχανικά, προστατεύοντας τον εντερικό βλεννογόνο που φλεγμένει, χάρη στην ικανότητά του να σχηματίζει ένα προστατευτικό φίλμ πρωτεΐνης φύσεως. Το φίλμ αυτό προσκολλήσται στο βλεννογόνο και δρα δεσμεύοντας τις φλεγμονώδεις βλεννοπρωτεΐνες που είναι υπεύθυνες για τη τοπική φλεγμονή, ευνοώντας την καθίζηση και την αποβολή τους μέσω των κοπράνων.

Το σύμπλοκο ζελατίνης με ταννικό οξύ δεν μεταβάλλεται στο στομάχι και πειτουργεί σχηματίζοντας ένα φίλμ που προστατεύει τον εντερικό βλεννογόνο, μειώνοντας την συνότητα και την διάρκεια των επεισοδίων της διάρροιας.

Το προϊόν είναι διαθέσιμο στη μορφή καψακίων για τους ενήλικες και στη μορφή σκόνης που συνίσταται για παιδιατρική χρήση.

Συσκευασία

Koutí που περιέχει 20 φακελάκια των 250mg (παιδιατρική χρήση)

Koutí που περιέχει blister με 15 καψάκια των 500mg.

Οδηγίες χρήσης

Καψάκια: καταπιείτε την κάψουλα με νερό

Σκόνη: διασκορπίστε το περιεχόμενο από ένα φακελάκι σε ένα ποτήρι με νερό.

Μπορεί επίσης να προστεθεί σε φρουτοχυμό ή σε γιαούρτι.

Δοσολογία

Ενήλικες: 1-2 καψάκια κάθε 4-6 ώρες μέχρι να εξαφανιστούν τα συμπτώματα.
Η δόση μπορεί να αυξηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες, αφού πρώτα έχετε συμβουλευτεί τον ιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Παιδιά κάτω των 3 ετών: 1 φακελάκι κάθε 6 ώρες μέχρι να εξαφανιστούν τα συμπτώματα.

Παιδιά από 3 έως 14 ετών: 1 ή 2 φακελάκια κάθε 6 ώρες μέχρι να εξαφανιστούν τα συμπτώματα.

Προειδοποιήσεις Παρακαλώ προσέξτε τις παρακάτω προειδοποιήσεις:

- Συμβουλεύτε τον παιδίατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
- Μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν μετά την ηλιξη που είναι τυπωμένη στη συσκευασία
- Μην χρησιμοποιήσετε τα φακελάκια εάν είναι ανοιγμένα ή κατεστραμμένα
- Αν και δεν υπάρχουν γνωστές παρενέργειες, συστίνεται το προϊόν να μην χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια της κύπησης ή κατά τους πρώτους μήνες της γαλουχίας. Σε κάθε περίπτωση συμβουλεύτε τον ιατρό ή τον φαρμακοποιό σας
- Συμβουλεύτε τον ιατρό σας εαν συνεχισθεί ο ερεθισμός του εντέρου ή η διάρροια
- Φυλάξτε το σε θερμοκρασία δωματίου μακριά από πηγές θερμότητας
- Μην το παγώσετε
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από τα παιδιά

Αντενδείξεις και ανεπιθύμητες ενέργειες

Δεν αναφέρονται ανεπιθύμητες ενέργειες ή αντενδείξεις που σχετίζονται με την χρήση του προϊόντος.



Διανομέας

Galenica a.e.

Ελευθερίας 4, Κηφισιά 145 64, τηλ.: 210 5281700

Κατασκευαστής

NOVINTETHICAL PHARMA SAGL

Via Pian Scairolo, 11
6915 Lugano-Switzerland